Übungsblatt 4

Aufgabe 29

Seien $\vec{x} = (x_1, x_2)$ und $\vec{y} = (y_1, y_2)$ zwei Vektoren im $\mathbb{R}^2$. Wie in der Vorlesung bezeichne $|\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ die Länge von $\vec{x}$ und $\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2$ das Skalarprodukt.

a) Die Projektion von $\vec{x}$ in Richtung $\vec{y}$ ist der Vektor

$$\vec{x}_{\vec{y}} := \left(\vec{x} \cdot \frac{\vec{y}}{|\vec{y}|} \right) \frac{\vec{y}}{|\vec{y}|}.$$

Zeigen Sie: $\vec{x} - \vec{x}_{\vec{y}}$ steht senkrecht auf $\vec{y}$ und es gilt $|\vec{x} \cdot \vec{y}| = |\vec{x}_{\vec{y}}| \cdot |\vec{y}| = |\vec{y}_{\vec{x}}| \cdot |\vec{x}|$.

b) Zeigen Sie: Es gilt die **Cauchy-Schwarz-Ungleichung**

$$|\vec{x} \cdot \vec{y}| \leq |\vec{x}| \cdot |\vec{y}|$$

und dort herrscht Gleichheit genau dann, wenn $\vec{x}$ und $\vec{y}$ linear abhängig sind, d.h. $\vec{x} = \lambda \vec{y}$. Was bedeutet das geometrisch? *Hinweis:* Berechnen Sie $|\vec{x} - \vec{x}_{\vec{y}}|^2$.

c) Folgern Sie aus b) die **Dreiecksungleichung** $|\vec{x} + \vec{y}| \leq |\vec{x}| + |\vec{y}|$.

d) Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung ist ein Spezialfall der Hölderschen Ungleichung in Aufgabe 26. Seien nun $p > 1$ und Zahlen $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \geq 0$ gegeben. Folgern Sie aus der Hölderschen Ungleichung die **Minkowskische Ungleichung**

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Die Dreiecksungleichung in c) ist ein Spezialfall dieser Ungleichung.

Aufgabe 30

Seien $f, g \in L^2[-\pi, \pi]$. Verwenden Sie in dieser Aufgabe nur die Grundeigenschaften des Skalarprodukts $\langle f, g \rangle$ (Vorlesung 4, Folie 4).

a) Zeigen Sie den **Satz des Pythagoras**: Ist f senkrecht auf g , so ist $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$.

b) Zeigen Sie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \cdot \|g\|.$$

Hinweis: Berechnen Sie wie in Aufgabe 29b) $\left\| f - \langle f, \frac{g}{\|g\|} \rangle \frac{g}{\|g\|} \right\|^2$.

c) Folgern Sie aus b) die Dreiecksungleichung

$$\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|.$$

d) Zeigen Sie den **Parallelogrammsatz** $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$.

Bemerkung: Es gelten auch analoge Versionen der Hölderschen und der Minkowskischen Ungleichung für Integrale.

Aufgabe 31

Es sei $\mathcal{P}$ die Menge aller Polynome $f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ vom Grad ≤ 2 . Für $f, g \in \mathcal{P}$ definieren wir

$$\langle f, g \rangle := f(0)g(0) + f'(0)g'(0) + f''(0)g''(0).$$

- a) Zeigen Sie, dass $\langle f, g \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathcal{P}$ ist, also die Grundeigenschaften erfüllt.
 b) Zeigen Sie: Aus $\langle f, f \rangle = 0$ folgt $f = 0$.
 c) Berechnen Sie den Abstand der Polynome $f(x) = x^2 + 1$ und $g(x) = x$ in $\mathcal{P}$.

Aufgabe 32

Seien $f, g \in L^2[-\pi, \pi]$.

- a) Sei s_N die N -te Partialsumme der Fourierreihe von f und t ein trigonometrisches Polynom vom Grad N . In der Vorlesung wurde gezeigt, dass $f - s_N$ senkrecht auf t steht. Zeigen Sie umgekehrt: Steht $f - t$ senkrecht auf jedem trigonometrischen Polynom s vom Grad N , so folgt $t = s_N$.
 b) In der Vorlesung wurde gezeigt, dass $\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n \rangle^2$ gegen $\|f\|^2$ konvergiert (Parsevalsche Gleichung). Zeigen Sie umgekehrt: Ist $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n^2$ irgendeine konvergente Reihe, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n e_n$ gegen eine Funktion $f \in L^2[-\pi, \pi]$ und es gilt $\alpha_n = \langle f, e_n \rangle$.
 c) Zeigen Sie die verallgemeinerte Parsevalsche Gleichung

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n \rangle \langle g, e_n \rangle.$$

Aufgabe 33

- a) Folgern Sie aus den Fourierreihenentwicklungen der Funktionen in Aufgabe 27a) die Reihenwerte

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

- b) Folgern Sie aus der Fourierreihenentwicklung von $g(x) = |\sin(x)|$ in Aufgabe 27b) die Reihenwerte

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.$$

Aufgabe 34

Sei f eine stetig differenzierbare Funktion mit $f(-\pi) = f(\pi)$ und $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$. Zeigen Sie:

- a) Es gilt die *Wirtingersche Ungleichung*

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)^2 dx.$$

Hinweis: Parsevalsche Gleichung.

- b) In a) gilt Gleichheit genau dann, wenn $f(x) = A \sin x + B \cos x$ für gewisse Konstanten A, B ist.

Aufgabe 35

Sei $f \in L^2[-\pi, \pi]$. Setzt man in die N -te Partialsumme der Fourierreihe von f die Formeln für die Fourierkoeffizienten a_n, b_n ein, so ergibt sich

$$s_N(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos(nt) \cos(nx) + \sin(nt) \sin(nx) \right) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

mit dem **Dirichlet-Kern** D_n . a) Beweisen Sie für D_n die Darstellung

$$D_n(t) = 1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos nt = \begin{cases} \frac{\sin(2N+1)\frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2}}, & \text{falls } t \neq 2\pi k \text{ für jedes } k \in \mathbb{Z}, \\ 2N+1, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- b) Begründen Sie: D_n ist gerade, 2π -periodisch und es gilt $\int_0^{\pi} D_n(t) dt = \pi$.
 c) Folgern Sie die Darstellung

$$s_N(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x-t) - f(x)}{\sin \frac{t}{2}} \sin(2N+1)\frac{t}{2} dt.$$

Bemerkung: Ist f differenzierbar in x , so kann man mithilfe des Satzes von Riemann-Lebesgue zeigen, dass dieser Ausdruck für $N \rightarrow \infty$ gegen 0 geht, also die Fourierreihe punktweise gegen $f(x)$ konvergiert.

Aufgabe 36

In Aufgabe 27 haben wir die Partialbruchzerlegung des Cotangens hyperbolicus hergeleitet; diese soll nun genutzt werden, um die Werte aller Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}$ zu berechnen. Zeigen Sie dazu nacheinander:

a) Aus der Wahl $\pi t = \frac{x}{2}$ erhält man die Darstellung

$$\frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^2}{x^2 + (2n\pi)^2}. \quad (1)$$

b) Mithilfe der geometrischen Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$ für $|q| < 1$ schreiben sich die Reihenglieder von (1) in der Form

$$\frac{2x^2}{x^2 + (2n\pi)^2} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k}}{(2n\pi)^{2k}} \text{ für kleine } |x|.$$

Für die linke Seite von (1) wird nun noch eine zweite Reihendarstellung hergeleitet. Die Exponentialfunktion kann in eine *Taylorreihe* entwickelt werden: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$ Für die Funktion

$$f(x) := \frac{x}{e^x - 1} = \frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \dots} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \right)^{-1}$$

machen wir den Ansatz $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = B_0 + B_1 x + B_2 \frac{x^2}{2} + B_3 \frac{x^3}{6} + \dots$

c) Durch Ausmultiplizieren und einen Koeffizientenvergleich ergibt sich $B_0 = 1$ und für $n = 1, 2, \dots$

$$B_0 \frac{1}{(n+1)!} + B_1 \frac{1}{n!} + \frac{B_2}{2} \frac{1}{(n-1)!} + \dots + \frac{B_n}{n!} = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^n B_k \binom{n+1}{k} = 0.$$

d) Die Zahlen B_n heißen **Bernoulli-Zahlen**. Sie berechnen sich mithilfe von c) sukzessive zu

$$B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_3 = 0, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_5 = 0, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_7 = 0, \dots$$

e) Die Funktion $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2} - 1$ ist gerade und daher gilt $B_{2n+1} = 0$ für $n = 1, 2, \dots$

f) Setzt man die Entwicklung von f in (1) ein, so erhält man die Gleichung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} x^{2k} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k}}{(2n\pi)^{2k}} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2\pi)^{2k}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} \right) x^{2k} \text{ für kleine } |x|$$

und aus einem Koeffizientenvergleich folgt schließlich die Formel

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1} \frac{B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}.$$

g) Man findet zum Beispiel die Reihenwerte

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

Bemerkung: Die Bestimmung der Werte aller Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k+1}}$ ist ein bis heute ungelöstes Problem.

Die Aufgaben können bis zum 03.06.25 digital an uwnkv@student.kit.edu zur Korrektur abgegeben werden.